


1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.
3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.
4. Indien een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), worden de maatregelen conform categorie 3-contacten (overige (niet nauwe) contacten) gevolgd
5. De quarantaine blijft ook gelden als er in de tussenliggende periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief is. De test is een momentopname. De test laat niet zien of de ziekte nog zal ontstaan.
6. Tenzij kritisch voor bedrijfsvoering; dan contact met kwetsbare patiënten vermijden
7. Als overige nauwe contacten worden beschouwd: Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als 'overig nauw contact' beschouwd.
8. Chirurgisch mondneusmaker gedurende de gehele werktijd; bij behandeling van patiënten PBM conform Leidraad Mondzorg Corona.
9. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

Schema inzetbaarheid zorgmedewerker in de mondzorg wanneer er geen sprake is van bron- en contactonderzoek door GGD – versie 2.0 16-12-2020



- a. Indien een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), worden de maatregelen conform categorie 3-contacten (overige (niet nauwe) contacten) gevolgd)
- b. Bij positieve uitslag van huisgenoot start het stroomschema opnieuw bij 'Positief geteste huisgenoot'
- c. De quarantaine blijft ook gelden als er in de tussenliggende periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief is. De test is een momentopname. De test laat niet zien of de ziekte nog zal ontstaan.
- d. Chirurgisch mondneusmaker gedurende de gehele werktijd; bij behandeling van patiënten PBM conform Leidraad Mondzorg Corona.
- e. Bijv. mondzorgverlener wordt geïnformeerd door GGD of patiënt in het kader van bron- of contactonderzoek
- f. Voorwaarden van de beschermde zorgsetting: adequaat gebruik PBM, juist toegepaste triage en juist toegepaste 'aanvullende maatregelen' (Zie Leidraad Mondzorg Corona)